

Isla Vista Youth Projects

Pautas para excluir niños y personal con enfermedades

Revisado 08/10/2021

Síntoma / Diagnóstico	¿Cuándo se excluirá al niño/personal? (enviado a casa o pedido quedarse en casa)	¿Cuándo puede regresar el niño/personal?	Comunicación Escolar
<p>1. Tiene síntomas del COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (100.4 o mas) o escalofríos • Tos • Falta de aliento o dificultad para respirar • Dolores musculares o corporales • Dolor de cabeza • Nueva pérdida del gusto o del olfato • Dolor de garganta • Congestión o secreción nasal • Náuseas o vómitos • Diarrea <p>*** Independientemente del estado de vacunación de la persona.</p>	Inmediatamente	<ul style="list-style-type: none"> • Han pasado al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. Y • Han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; Y • Otros síntomas han mejorado; O • Un proveedor de atención médica ha proporcionado documentación de que los síntomas son típicos de su condición crónica subyacente (por ejemplo, alergias o asma), O • Un proveedor de atención médica ha confirmado un diagnóstico alternativo con nombre (por ejemplo, faringitis estreptocócica, virus coxsackie), O • Tienen una prueba negativa del SARS-CoV-2 y los síntomas han mejorado. 	
<p>2. Personas NO VACUNADOS que han estado en <u>contacto cercano</u> con alguien que tiene un caso confirmado de COVID-19</p> <p>Un contacto cercano es: Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos más durante un período de 24 horas.</p> <p>Una persona infectada puede propagar el SARS-CoV-2 a partir de 2 días antes de que tenga algún síntoma (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la fecha de recolección de muestras positivas).</p>	<p>Inmediatamente después de aprender que, el niño (o el personal) ha tenido contacto</p> <p><i>Si es sintomático - vea los criterios para los síntomas (numero 1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para los contactos cercanos que son asintomáticos, puede interrumpir la auto-cuarentena bajo las siguientes condiciones aplicables: <ul style="list-style-type: none"> i. La cuarentena puede terminar después del día 10 a partir de la fecha de la última exposición sin pruebas; O ii. SOLO PARA NIÑOS Cuarentena por 10 Días; Y la cuarentena puede terminar el Día 8 si se recoge una muestra de diagnóstico el Día 6 o 7 a partir de la fecha de la última exposición y el resultado de la prueba es negativo. • Para interrumpir la cuarentena antes de los 14 Días siguientes a la última exposición conocida, los contactos cercanos asintomáticos deben: <ul style="list-style-type: none"> i. Continuar con el autocontrol diario de los síntomas hasta el Día 14 desde la última exposición conocida; Y ii. Siga todas las intervenciones no farmacéuticas recomendadas (por ejemplo, usar una máscara cuando esté cerca de otras personas, lavarse las manos, evitar aglomeraciones) hasta el Día 14 desde la última exposición conocida; Y iii. Si se presenta algún síntoma durante este período de 14 Días, la persona expuesta debe aislarse inmediatamente, hacerse la prueba y ponerse en contacto con su proveedor de atención médica con cualquier pregunta con respecto a su atención. iv. Cualquier contacto que desarrolle síntomas debe aislarse y probarse y permanecer en cuarentena hasta que los síntomas desaparezcan. 	<p>Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido (no se necesita acción si la exposición no ocurrió en la escuela)</p>
<p>3. Personas COMPLETAMENTE VACUNADOS que han estado en <u>contacto cercano</u> con alguien que tiene un caso confirmado de COVID-19</p>	<p>Si asintomático - sin cuarentena.</p> <p><i>Si es sintomático - vea los criterios para los síntomas (numero 1)</i></p>	<p>Puede abstenerse de cuarentena y prueba después de una exposición conocida si es asintomático.</p> <p>Continúe el autocontrol diario para los síntomas hasta el día 14 de la última exposición conocida.</p> <p><i>Nota: Los CDC recomiendan que las personas vacunadas se hagan la prueba de 3 a 5 días después de la exposición a alguien con COVID-19 sospechoso o confirmado y usen una máscara en interiores lugares públicos durante 14 días después de la exposición o hasta que reciban un resultado negativo de la prueba.</i></p>	
<p>4. Caso COVID-19 confirmado</p> <p>*** Independientemente del estado de vacunación de la persona.</p>	Inmediatamente	<p>Puede regresar a la escuela una vez que se cumplan los criterios para regresar a la escuela para aquellos con síntomas. (ver número 1)</p> <p>Siga las recomendaciones de cuarentena para los contactos cercanos enumerados anteriormente. (ver número 2)</p>	<p>Notificación a la comunidad escolar de un caso conocido</p>
<p>5. Prueba negativa después de que los síntomas se resuelven</p>		<p>Pueden regresar a la escuela una vez que hayan cumplido con los criterios para regresar a la escuela para aquellos con síntomas. (ver número 1)</p>	<p>Considere la notificación a la comunidad escolar si hubo conocimiento previo de la prueba</p>

Pautas para excluir a niños y personal con enfermedades (Cont.)

Síntoma / Diagnóstico	¿Cuándo se excluirá al niño/personal? <small>(enviado a casa o pedido quedarse en casa)</small>	¿Cuándo puede regresar el niño/personal?	Comunicación Escolar
Varicela	Cuando las lesiones se notan o están presentes	Cuando TODAS las lesiones están secas y con costra: por lo general, dura más de 6 días	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
<u>Síntomas de resfriado</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nariz que moquea o congestionada • Estornudos • Picazón de ojos o llorosos <i>Ver síntomas del COVID-19</i>	Si va acompañado de fiebre <i>(ver criterios de fiebre)</i>	Cuando se resuelvan los criterios de exclusión o con una nota del médico que indique que el niño/personal ya no es contagioso	
Diarrea	<i>Consulte las pautas de Covid-19</i>	<i>Consulte las pautas de Covid-19</i>	
Rozadura del pañal	Si las úlceras supuran y gotean líquido corporal fuera del pañal	Cuando se resuelven los criterios de exclusión	
Fiebre	<i>Consulte las pautas de Covid-19 (> 100.4)</i>	<i>Consulte las pautas de Covid-19</i>	
Síndrome de manos, pies y boca	Cuando las lesiones se notan o están presentes	Cuando se resuelven los criterios de exclusión Por lo general, lleva más de 6 días	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
Piojos de la cabeza	Cuando se notan o presentan liendres (huevos), ninfas (adolescentes) o adultos	Cuando se resuelven los criterios de exclusión (lo que significa que ninguno está visible, presente)	Considere la notificación a la comunidad escolar de un contacto conocido
Irritabilidad	Si la irritabilidad no se puede redirigir y/o impide que el niño pueda participar	Cuando el niño es capaz de ser redirigida	
Comezón	Si se sospecha que la picazón es causada por alguno de los siguientes: Sarna, impétigo, tiña o cualquier cosa mencionada anteriormente	Cuando se resuelven los criterios de exclusión O con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso	
Letargo	Si el letargo impide la participación	Cuando se resuelven los criterios de exclusión	
Úlceras de boca	Cuando las úlceras causan babeo	Cuando se resuelven los criterios de exclusión O con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso	
Ojo rosado (conjuntivitis) o orzuelo	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se nota la descarga • Ojos rosados/rojos hinchados o irritados 	Cuando se resuelven los criterios de exclusión O después de 48 horas de antibióticos O al menos 5 días de aislamiento en el hogar han pasado y no hay signos visibles de infección	
Sarpullido o erupción	<p>Cuando se nota una erupción no identificada y se acompaña de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de comportamiento • Fiebre • Tiene supuración/herida abierta • El niño no puede participar 	Cuando se resuelven los criterios de exclusión o con una nota del médico que indique que el niño no es contagioso	
Faringitis estreptocócica	Si el niño tiene una cultura positiva de estreptococos	Después de al menos 48 horas de antibióticos.	
Vómito	En la segunda aparición dentro de las 24 horas	Después de 24 horas sin más vómitos y sin otros síntomas	

El Director de IVYP (o administración) se reserva el derecho de excluir / incluir a los niños / personal cuando lo consideren conveniente o lo consideren necesario. Tenga en cuenta que se recomienda que mantenga a su hijo en casa si lo considera necesario o apropiado.